

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
02.08.2013 р. № 684

Ресстраційне посвідчення
№ UA/13157/01/01

ЗМІНИ ВНЕСЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
15.09.2016 № 973

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛЮКОЗА-ТЕСТ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: dextrose;

1 контейнер або саше містить глюкози моногідрату 75 г.

Лікарська форма.

Порошок для орального розчину.

Кристалічний порошок білого або майже білого кольору із солодким смаком.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Исток-Плюс»

Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 4

Фармакотерапевтична група. Діагностичні засоби.

Код АТС V04C A02.

Глюкоза бере участь у вуглеводному обміні. Препарат добре всмоктується у травному тракті, з током крові розноситься в усі органи і тканини; продукти його обміну виводяться із сечею.

Показання для застосування.

Застосовують при проведенні тесту толерантності до глюкози, коли вміст глюкози в крові не дає можливості встановити діагноз порушення толерантності до глюкози або цукрового діабету.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість.

Особливі застереження.

- Пробу на толерантність до глюкози варто проводити хворому в спокійному стані, цьому не повинні передувати стресові ситуації або неадекватні навантаження.
- Під час проведення досліджень пацієнт повинен спокійно сидіти (або лежати); паління, фізичні навантаження неприпустимі.
- Тест не рекомендується проводити після виснажливих хвороб, операцій і пологів, при запальних процесах, інфекційних захворюваннях, гарячковому стані, алкогольному цирозі печінки, гепатитах, під час менструацій, при захворюваннях травного тракту з порушенням всмоктування глюкози, злоякісних захворюваннях.
- Напередодні та у день дослідження необхідно відмінити прийом медикаментів (адреналіну, глюкокортикоїдів, кофеїну, діуретину, морфіну, сечогінних тіазидового ряду, дифеніну, психотропних засобів і антидепресантів), а також лікувальні процедури, які можуть вплинути на рівень глюкози в крові.
- Хибнопозитивні результати спостерігаються при гіпокаліємії, дисфункції печінки, ендокринопатіях.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Проведення тесту толерантності до глюкози в період вагітності та годування груддю не протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не впливає.

Діти

Застосовують у педіатричній практиці за показаннями.

Спосіб застосування та дози.

Досліджувані не менш ніж за 3 дні до проби повинні дотримуватися звичайного режиму харчування (із вмістом вуглеводів не менше 150-200 г за добу) і фізичних навантажень. Першу пробу беруть уранці натще, після нічного голодування упродовж 10–14 год (пити воду дозволяється).

Після першого взяття крові з пальця досліджуваній приймає 75 г глюкози, розчиненої у 250–500 мл води упродовж 2–5 хв. Для поліпшення смакових якостей розчину (і запобігання нудоти в окремих осіб) можна додати сік лимона або лимонної кислоти.

При проведенні проби у осіб з надлишковою вагою глюкозу дають із розрахунку 1 г на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г.

Для дітей кількість глюкози становить 1,75 г на 1 кг маси тіла, але не більше 75 г.

Через 2 год визначається рівень глюкози в крові.

Оцінка результатів. Оцінити результати тесту можна за наведеною таблицею.

Стан	Вміст глюкози у капілярній крові, ммоль/л (мг %)	
	натще	через 2 год після прийому глюкози
Норма	< 5,5 (100)	< 7,8 (140)
Порушена толерантність до глюкози	< 6,1 (110)	> 7,8 < 11,1 (> 140 < 200)
Цукровий діабет	> 6,1 (110)	> 11,1 (> 200)

Для венозної крові порогові значення будуть приблизно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) нижче.

Передозування.

При одноразовому застосуванні великої кількості препарату можливе порушення травлення

(нудота, здуття живота, пронос). Рекомендована симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

У осіб з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відмічено.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 30 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 75 г порошку у контейнері. По 1 контейнеру у картонній коробці або без.

По 75 г порошку у саше. По 1 саше у картонній коробці або без.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.